

Ukrudtsbekæmpelse i havre

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	BI	Pris	Bemærkninger
Burresterre , fuglegræs , gulurt , hanekro , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , storkenæb	Ukrudt 0-2 løvblade	Express 50 SX + Starane 333 HL + Spredet-klæbemiddel	5 + 0,15 + 0,15	0,73	59	Tokimbladet ukrudt incl. resistent fuglegræs. Bred effekt. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl.
Burresterre , fuglegræs , gulurt , hejrenæb , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , sort natskygge , storkenæb	Ukrudt 0-2 løvblade	Express 50 SX + Starane XL + Spredet-klæbemiddel	5 + 0,2 + 0,15	0,59	51	Tokimbladet ukrudt. Bred effekt. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl. Starane XL kan erstattes af Cleave.
Burresterre , fuglegræs , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt	Ukrudt 0-2 løvblade	Express 50 SX + Starane XL + Spredet-klæbemiddel	3 + 0,4 + 0,15	0,72	78	Tokimbladet ukrudt. Høj effekt mod burresterre og pileurter. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl.
Bleg pileurt , burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , vejpileurt	Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov	Express 50 SX + Starane 333 HL Starane XL	6 + 0,15 0,3 - 0,5	1,18-1,44	106-139	Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Væsentlig del af effekt mod fersken og bleg pileurt fra ALS-hæmmere.
Agerstedmoder , bleg pileurt , burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , storkenæb , tvetand , vejpileurt	Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere	Mustang forte Starane 333 HL	0,75 0,25 - 0,3	1,75-1,88	196-209	Resistent pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. I stadiet 21 når væsentlig del af pileurt er spiret frem, typisk langstrakt fremspiring under tørre vejrforhold.
Burresterre , ferskenpileurt , fuglegræs , gul okseøj , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , snerlepileurt , vejpileurt	Ukrudt 0-2 løvblade	Mustang forte	0,3 - 0,5	0,43-0,72	51-85	Gul okseøj. Sprøjt tidligt, gul okseøj max. 2 løvblade. Ikke roer, bælgplanter eller kartofler året efter.
Andet tokimbladet ukrudt , gul okseøj	Ukrudt 0-2 løvblade	Nicanor SG + Metaxon	(8 + 0,3) - (10 + 0,5)	0,55-0,75	83-131	Gul okseøj. Sprøjt i st. 20, gul okseøj max. 2 løvblade. Højeste dosis, hvis mange okseøj har 2 løvblade. Nicanor (Ally) kan erstattes med Accurate Max.