

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	BI	Pris	Bemærkninger
Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , snerlepileurt , tvetand , ærenpris	Ukrudt 0-2 løvblade	Express 50 SX + DFF + Starane 333 HL + Sprede-klæbemiddel	(5 + 0,03 + 0,1 + 0,1) - (9 + 0,03 + 0,1 + 0,1)	0,80-1,06	55-66	Tokimbladet ukrudt. Meget bred virkning incl. burresnerre og resistant fuglegræs. Express kan erstattes af Trimmer, Nuance m.fl. DFF kan erstattes med Legacy, Diflaniil m.fl. Højeste dosis ved meget ukrudt og forventning om åben afgrøde.
Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , hyrdetaske , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , snerlepileurt , tvetand , ærenpris	Ukrudt 0-2 løvblade	Express Gold 33 SX + DFF + Starane 333 HL + Sprede-klæbemiddel	(5 + 0,03 + 0,1 + 0,1) - (9 + 0,03 + 0,1 + 0,1)	0,75-0,98	59-72	Tokimbladet ukrudt. Meget bred virkning incl. burresnerre og resistant fuglegræs. Express kan erstattes af Trimmer, Nuance m.fl. DFF kan erstattes med Legacy, Diflaniil m.fl. Højeste dosis ved meget ukrudt og forventning om åben afgrøde.
Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , lægejordrød , pileurt , storkenæb , tvetand , ærenpris	Ukrudt 0-2 løvblade	Zypar + DFF	0,3 + 0,03	0,65	76	Tokimbladet ukrudt incl. jordrød og storkenæb. Bred virkning, herunder burresnerre og resistant fuglegræs. DFF kan erstattes af Legacy m.fl.
Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , lægejordrød , pileurt , storkenæb , tvetand , ærenpris	Ukrudt 0-2 løvblade	Pixxaro EC + Nicanor SG + DFF	0,2 + 3 + 0,02	0,93	101	Tokimbladet ukrudt incl. jordrød og storkenæb. Bred virkning, herunder burresnerre og resistant fuglegræs.
Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , lægejordrød , pileurt , storkenæb , tvetand , ærenpris	Ukrudt 0-2 løvblade	Pixxaro EC + Express Gold 33 SX + DFF + Sprede-klæbemiddel	0,15 + 5 + 0,03 + 0,15	0,97	97	Tokimbladet ukrudt incl. jordrød og storkenæb. Bred virkning, herunder burresnerre og resistant fuglegræs.
Agerstedmoder , burresnerre , fuglegræs , hanekro , hvidmelet gåsefod , kamille , korsblomstret ukrudt , pileurt , stedmoder , tvetand , ærenpris	Ukrudt 0-2 løvblade	Mustang forte + DFF	0,3 + 0,03	0,63	63	Tokimbladet ukrudt. Bred virkning, herunder burresnerre og resistant kamille. Ikke roer, bælgplanter eller kartofler året efter.

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	Bl	Pris	Bemærkninger
<u>Agerstedmoder</u> , <u>burresnerre</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hanekro</u> , <u>hvidmelet gåsefod</u> , <u>hyrdetaske</u> , <u>kamille</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>pileurt</u> , <u>snerlepileurt</u> , <u>tvetand</u> , <u>ærenpris</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Saracen M + DFF</u> + <u>Starane 333 HL</u> + <u>Sprede-klæbemiddel</u>	0,025 + 0,025 + 0,1 + 0,1	0,68	75	Tokimbladet ukrudt. Meget bred virkning incl. burresnerre og resistant fuglegræs. DFF kan erstattes med Legacy, Diflaniil m.fl.
<u>Burresnerre</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>gulurt</u> , <u>hejrenæb</u> , <u>kamille</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>pileurt</u> , <u>sort natskygge</u> , <u>storkenæb</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Express 50 SX</u> + <u>Starane XL</u> + <u>Sprede-klæbemiddel</u>	5 + 0,2 + 0,15	0,59	51	Tokimbladet ukrudt. Bred effekt. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl. Starane XL kan erstattes af Cleave.
<u>Burresnerre</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hvidmelet gåsefod</u> , <u>kamille</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>pileurt</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Express 50 SX</u> + <u>Starane XL</u> + <u>Sprede-klæbemiddel</u>	3 + 0,4 + 0,15	0,72	78	Tokimbladet ukrudt. Høj effekt mod burresnerre og pileurter. Express kan erstattes med Nuance, Trimmer m.fl.
<u>Enårig rapgræs</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hanekro</u> , <u>hvidmelet gåsefod</u> , <u>kamille</u> , <u>kornvalmue</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>vindaks</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Hussar Plus OD</u> + <u>DFF</u> + <u>Sprede-klæbemiddel</u>	0,07 + 0,05 + 0,15	1,53	113	Enårig rapgræs og tokimbladet ukrudt. Hussar Plus OD har effekt mod rajgræs.
<u>Bleg pileurt</u> , <u>burresnerre</u> , <u>ferskenpileurt</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hanekro</u> , <u>hvidmelet gåsefod</u> , <u>kamille</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>snerlepileurt</u> , <u>vejpileurt</u>	Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov	<u>Express 50 SX</u> + <u>Starane 333 HL</u> <u>Starane XL</u>	6 + 0,15 0,3 - 0,5	1,18-1,44	106-139	Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Væsentlig del af effekt mod fersken og bleg pileurt fra ALS-hæmmere.
<u>Agerstedmoder</u> , <u>bleg pileurt</u> , <u>burresnerre</u> , <u>ferskenpileurt</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hanekro</u> , <u>hvidmelet gåsefod</u> , <u>kamille</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>snerlepileurt</u> , <u>storkenæb</u> , <u>tvetand</u> , <u>vejpileurt</u>	Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov	<u>Mustang forte</u> + <u>DFF</u> <u>Starane XL</u>	0,3 + 0,03 0,3 - 0,5	1,02-1,28	112-145	Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Hormonstoffer aminopyralid og 2,4-D i Mustang forte har effekt mod fersken og bleg pileurt, men væsentlig del af effekt er ALS-hæmmere i både 1. og 2. sprøjtning.
<u>Agerstedmoder</u> , <u>bleg pileurt</u> , <u>burresnerre</u> , <u>ferskenpileurt</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hanekro</u> , <u>hvidmelet gåsefod</u> , <u>kamille</u> , <u>korsblomstret ukrudt</u> , <u>snerlepileurt</u> , <u>storkenæb</u> , <u>tvetand</u> , <u>vejpileurt</u>	Ukrudt 0-2 løvblade 2. sprøjtning 10-14 dage senere hvis behov	<u>Pixxaro EC</u> + <u>DFF</u> <u>Mustang forte</u>	0,125 + 0,05 0,3	1,17	124	Pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når næste hold ukrudt er spiret frem. Løsning med andre virkemekanismer end ALS-hæmmere mod pileurter i første sprøjtning.
<u>Agerstedmoder</u> , <u>bleg pileurt</u> , <u>burresnerre</u> , <u>ferskenpileurt</u> , <u>fuglegræs</u> , <u>hanekro</u> ,	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Pixxaro EC</u> + <u>DFF</u>	0,125 + 0,05	1,46-1,82	158-200	Resistant pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. Sprøjt første gang når pileurt har max. et løvblad og igen når

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	Bl	Pris	Bemærkninger
<u>hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, snerlepileurt, storkenæb, tvetand, vejpileurt</u>	2. sprøjtning 10-14 dage senere	<u>Mustang forte</u>	0,5 - 0,75			næste hold ukrudt er spiret frem. Dosis af Mustang forte tilpasses effekt af 1. sprøjtning, fra 0,3 l/ha hvis der kun er nyfremspiring.
<u>Agerstedmoder, bleg pileurt, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, snerlepileurt, storkenæb, tvetand, vejpileurt</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Mustang forte</u>	0,75	1,75-1,88	196-209	Resistent pileurt og andet tokimbladet ukrudt på lavbundsjord. I stadie 21 når væsentlig del af pileurt er spiret frem, typisk langstrakt fremspirling under tørre vejrforhold.
<u>Agerstedmoder, burresnerre, ferskenpileurt, fuglegræs, gul okseøje, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, snerlepileurt, vejpileurt, ærenpris</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Mustang forte</u> + <u>DFF</u>	(0,3 + 0,025) - (0,5 + 0,025)	0,60-0,89	61-94	Gul okseøje. Sprøjt tidligt, gul okseøje max. 2 løvblade. Ikke roer, bælgplanter eller kartofler året efter.
<u>Andet tokimbladet ukrudt, gul okseøje</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Nicanor SG</u> + <u>Metaxon</u>	(8 + 0,3) - (10 + 0,5)	0,55-0,75	83-131	Gul okseøje. Sprøjt i st. 20, gul okseøje max. 2 løvblade. Højeste dosis, hvis mange okseøje har 2 løvblade. Nicanor (Ally) kan erstattes med Accurate Max.
<u>Agerrævehale, agerstedmoder, burresnerre, flyvehavre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, kamille, korsblomstret ukrudt, pileurt, rajgræs, rød tvetand</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Broadway</u> + <u>PG 26N</u>	(75 + 0,5) - (145 + 0,5)	0,71-1,37	114-194	Agerrævehale, rajgræs, flyvehavre og tokimbladet ukrudt. Højeste dosis mod flyvehavre og græsser samt agerstedmoder og rød tvetand. Moderat effekt mod hanespore (60-80 procent baseret på få forsøg).
<u>Agerrævehale, burresnerre, flyvehavre, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, kornvalmue, korsblomstret ukrudt, lægejordrøg, pileurt, rød tvetand, snerlepileurt, storkenæb, ærenpris</u>	Ukrudt 0-2 løvblade	<u>Rexade 440</u> + <u>PG 26N</u>	(25 + 0,5) - (40 + 0,5)	1,14-1,82	136-200	Storkenæb, jordrøg og andet tokimbladet ukrudt samt agerrævehale, rajgræs og flyvehavre. Højeste dosis mod flyvehavre og andre græsser.
<u>Agerrævehale, agerstedmoder, fuglegræs, hanekro, hvidmelet gåsefod, hyrdetaske, kamille, korsblomstret ukrudt,</u>	Afgrødens stadium 12-25	<u>Primera Super</u> + <u>Sprede-klæbemiddel</u> + <u>DFF</u> + <u>Express 50 SX</u>	(0,5 + 0,15 + 0,03 + 7,5) - (0,6 + 0,15 + 0,03 + 7,5)	1,20-1,30	133-153	Agerrævehale og tokimbladet ukrudt. Når agerrævehale har 1-2 blade. Primera Super kan blandes med visse ukrudtsmidler. Foxtrot kan anvendes i stedet for Primera Super.

Skadegørere	Tidspunkt	Løsning	Dosis pr. ha.	Bl	Pris	Bemærkninger
<u>snerlepileurt</u> , <u>tvetand</u> , <u>ærenpris</u>						
<u>Agerrævehale</u> , <u>alm.</u> <u>hanespore</u> , <u>flyvehavre</u> , <u>grøn</u> <u>skærmaks</u>	Afgrødens stadium 14-25	<u>Primera Super</u> + <u>Sprede-klæbemiddel</u>	0,8 + 0,15	0,80	161	Flyvehavre, hanespore, grøn skærmaks, agerrævehale. Kan anvendes fra afgrødens stadium 13-14, hvor flyvehavren vil være spiret frem. Hanespore har sen fremspiring. Primera Super kan blandes med visse ukrudtsmidler, tjek etikette eller blandingstabell. Foxtrot kan anvendes i stedet for Primera Super.
<u>Agerrævehale</u> , <u>alm.</u> <u>hanespore</u> , <u>flyvehavre</u> , <u>grøn</u> <u>skærmaks</u>	Afgrødens stadium 14-25	<u>Topik EC</u> + <u>Renol</u>	0,3 + 0,5	0,75	274	Flyvehavre, hanespore og grøn skærmaks. Kan anvendes fra afgrødens stadium 13-14, hvor flyvehavren vil være spiret frem. Topik kan blandes med visse ukrudtsmidler, tjek blandingstabell/etikette.

22-03-2023

[Dansk Landbrugsrådgivning](#) | [SEGES Innovation](#)Data leveret af [Middeldatabasen](#)